

PROVİTAMİN MULTİFORCE



KANATLILAR İÇİN ORGANİK ASİT, AMİNO ASİT, ORGANİK MİNERAL

TANIM. KOD	AKTİF MADDE	KATKI ADI	PREMİKS DÜZEVİ	BİRİM
2b17002	L-ALANİNE	ALANİN	25.000	MG/L
2b17003	L-ARGİNİNE	ARJİNİN	40.000	MG/L
	L-ASPARAGİNE	ASPARAJİN	700	MG/L
2b17005	L-ASPARTIC ACID	ASPARTİK ASİT	12.000	MG/L
2b17033	L-CVSTEİNE	SİSTEİN	20.000	MG/L
2b620	L-GLUTAMIC ACID	GLUTAMİK ASİT	60.000	MG/L
	L-GLUTAMİNE	GLUTAMİN	10.000	MG/L
2b17034	GLYCİNE	GLİSİN	25.000	MG/L
2b17010	L-ISOLEUCİNE	İZOLÖSİN	25.000	MG/L
2b17012	L-LEUCİNE	LÖSİN	45.000	MG/L
3.2.1.	L-LVSİNE	LİZİN	35.000	MG/L
2b17027	L-METHİONİNE	METİHİONİN	35.000	MG/L
2b17018	L-PHENYLALANİNE	FENİLALANİN	30.000	MG/L
2b17019	L-PROLİNE	PROLİN	30.000	MG/L
2b17020	L-SERİNE	SERİN	22.000	MG/L
2b17022	L-THREONİNE	TREONİN	20.000	MG/L
3c441	L-TRYPTOPHAN	TRİPTOFAN	450	MG/L
2b17028	L-VALİNE	VALİN	29.800	MG/L
E 260	ASETİK ASİT	ASETİK ASİT	50.000	MG/L
E 270	LAKTİK ASİT	LAKTİK ASİT	25.000	MG/L
E 330	SİTRİK ASİT	SİTRİK ASİT ANHİDRAT	10.000	MG/L
E 6	ORGANİK ÇİNKO	ÇİNKO ASETAT	15.000	MG/L
E 1	ORGANİK DEMİR	DEMİR ASETAT	15.000	MG/L
E 5	ORGANİK MANGAN	MANGAN ASETAT	15.000	MG/L
E 4	ORGANİK BAKIR	BAKIR ASETAT	10.000	MG/L
E 263	KALSİYUM	KALSİYUM ASETAT	6.000	MG/L
E 518	MAGNEZYUM	MAGNEZYUM ASETAT	6.000	MG/L
E 262 (i)	SODYUM	SODYUM ASETAT	5.000	MG/L
E 202	POTASYUM	POTASYUM SORBAT	2.500	MG/L
E 211	SODYUM	SODYUM BENZOAT	2.500	MG/L
12.1.5.	M.O.S.	MANNAN OLİGO SAKKARİT	10.000	MG/L
	AROMA	KAVUN AROMASI	5.000	MG/L
E 1520	PROPİLEN GLİKOL SU	MONO PROPİLEN GLİKOL	100.000	MG/L
		DEİYONİZE SU	o.s.d.	MG/L

KULLANIM AMACI

Suda çözünabilir formda üretilen, içeriğindeki, organik asitler, organik mineraller amino asitler ve özel formüle edilmiş aktif su bileşiminden oluşan, yumurtacı tavuk, broyler tavuk ve civcivler içme sularına katılarak iskelet sistemini ve karkas et randımanını da etkileyen, ayrıca yumurta kabuk kalitesini artırıcı özelliğine sahip yardımcı bir üründür.

KULLANIMI ŞEKLİ

Yumurtacı tavuk, broyler tavuk ve civcivler için 1 ton içme suyuına 0,5-1 L olarak kullanımını tavsiye ederiz.

GENEL UYARILAR

- Oda sıcaklığında 20-25 °C ışıksız ve serin ve rutubetsiz yerlerde saklayınız.
- Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.
- Bu bir ilaç değil premikstir. Tedavi amacıyla kullanılmaz.

RAF ÖMRÜ

Üretim tarihinden itibaren 24 ay içerisinde kullanılmalıdır.

AMBALAJ ŞEKLİ

5 l'lik bidonlarda takdim edilmektedir.