



PROVITA PHARMA
İLAÇ KİMYA İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

provitapharma.com.tr

2021
ÜRÜN
KATALOĞU





VAM START



VİTAMİN MİNERAL AMİNO ASİT PREMİKS

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI

Hayvanların büyüme, gelişme ve verim artırma amacı ile kullanılmaktadır. İçerisinde bulundurduğu B grubu vitaminler, organik asit, amino asit ve mineraller sayesinde büyüme faktörü olarak kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Siğir, koyun-keçi ve atlarda klasik genel doz olarak ton içme suyuna 1 L katılır. Kanatlılarda 1 ton içme suyuna 1-2 L katılarak 3-5 gün boyunca kullanılır. Pratikte hayvan başına içme suyuna ilave edilerek; **Siğirlerde:** 15-30 ml, **Buzağılarda:** 3-5ml **Koyun-Keçilerde:** 2-4 ml **Kuzu ve oğlaklarda:** 1-2 ml uygulanır. Hayvan ve sürünün genel durumuna bağlı olarak siğir, koyun ve keçilerde ürünün uygulama süresi veteriner hekim tarafından belirlenebilir.

Depolama Şekli: Güneş görmeyen, serin ve ağız kapalı muhafaza edilmelidir.

Ticari Takdim Şekli: 100 GR - 250 GR - 500 GR - 1 L ve 5 L'lik plastik şişe ve bidon ambalajlarda sunulmaktadır.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSIDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

İÇERİKLER	Her Litrede
VİTAMİN B1	1.000 MG/L
VİTAMİN B2	1.500 MG/L
VİTAMİN B3	2.000 MG/L
VİTAMİN B5	1.200 MG/L
VİTAMİN B6	1.800 MG/L
VİTAMİN B7	4 MG/L
VİTAMİN B8	10.000 MG/L
VİTAMİN B9	800 MG/L
VİTAMİN B12	2 MG/L
FERRİK AMONYUM SİTRAT	15.000 MG/L
BAKIR GLİSİN ŞELAT	10.000 MG/L
ÇİNKO GLİSİN ŞELAT	10.000 MG/L
KOLİN	20.000 MG/L
LİZİN	15.000 MG/L
METHİONİN	25.000 MG/L
GLİSİN	20.000 MG/L
ÇİLEK AROMASI	5.000 MG/L
GLİSERİN	q.s.p. MG/L



ORGAMİNO EXTRA



VİTAMİN MİNERAL AMİNO ASİT ve ORGANİK ASİT PREMİKS

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI

Hayvanlar da Amino Asit, Organic Asit, Vitamin ve Mineral ihtiyaçlarını karşılamak ve Hayvanlarda gelişimin hızlanmasını sağlamak için kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Siğir, koyun-keçi ve atlarda klasik genel doz olarak ton içme suyuna 1 L katılır. Kanatlılarda 1 ton içme suyuna 1-2 L katılarak 3-5 gün boyunca kullanılır. Pratikte hayvan başına içme suyuna ilave edilerek; **Siğirlerde:** 15-30 ml, **Buzoğullarda:** 3-5ml **Koyun-Keçilerde:** 2-4 ml **Kuzu ve oğlaklarda:** 1-2 ml uygulanır. Hayvan ve sürünün genel durumuna bağlı olarak siğir, koyun ve keçilerde ürünün uygulama süresi veteriner hekim tarafından belirlenebilir.

Ticari Takdim Şekli: 100 GR - 250 GR - 500 GR - 1 L ve 5 L'lik plastik şişe ve bidon ambalajlarda sunulmaktadır.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILMAZ.

İDEAL SAKLAMA KOŞULLARI

Güneş görmeyen serin ve ağız kapalı muhafaza edilmelidir.

İÇERİKLER	Her Litrede
L-ALANINE	25.000 MG/L
L-ARGININE	40.000 MG/L
L-ASPARAGINE	700 MG/L
L-ASPARTIC ACİD	12.000 MG/L
L-CYSTEINE	20.000 MG/L
L-GLUTAMIC ACİD	60.000 MG/L
L-GLUTAMINE	10.000 MG/L
GLYCİNE	25.000 MG/L
L-ISOLEUCİNE	25.000 MG/L
L-LEUCİNE	45.000 MG/L
L-LYSİNE	35.000 MG/L
L-METHIONINE	35.000 MG/L
L-PHENYLANINE	30.000 MG/L
L-PROLINE	30.000 MG/L
L-SERİNE	22.000 MG/L
L-THREONINE	20.000 MG/L
L-TRYPTOPHAN	450 MG/L
L-VALİNE	29.800 MG/L
ASETİK ASİT	50.000 MG/L
LAKTİK ASİT	25.000 MG/L
SİTRİK ASİT	10.000 MG/L
ORGANİK ÇİNKO	15.000 MG/L
ORGANİK DEMİR	15.000 MG/L
ORGANİK MANGAN	15.000 MG/L
ORGANİK BAKIR	10.000 MG/L
KALSİYUM	6.000 MG/L
MAGNEZYUM	6.000 MG/L
SODYUM	5.000 MG/L
POTASYUM	2.500 MG/L
SODYUM	2.500 MG/L
M.O.S.	10.000 MG/L
AROMA	5.000 MG/L
PROPILEN GLİKOL	100.000 MG/L
SU	q.s.p. MG/L



AMINO FORCE



VİTAMİN ve AMİNO ASİT PREMİKS

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI

- Vitamin ve amino asitlerin akut ve kronik eksikliklerinin giderilmesinde,
- Hayvanların büyümeleri için gerekli olan elementlerin sağlanmasında,
- Hayvanların gelişimlerini tamamlamalarında,
- Verimlerini, yemden yararlanma oranlarını arttırmada,
- Bağışıklık sistemlerini güçlendirmede,
- Mortalitenin düşürülmesinde,
- Malnutrisyonun, yağlı karaciğer olgularının, stres periyotlarının, iyileşme dönemlerinin, gebelik durumlarının iyileştirilmesinde,
- Hastalık dönemlerinde organizmanın desteklenmesinde,
- Atlarda hayvanların koşu ve yarışa hazırlanmalarında ve sonrasında kas ve eklemlerin desteklenmesi amacıyla kullanılır.
- Kanatlılarda olumsuz çevre koşullarında, nakliye, aşılama, gaga kesimi ve dalgalı verim dönemlerinde, toksikasyon olaylarında, tüy dökümünde, yumurtlamaya başlama dönemlerinde ve antibiyotik kullanımı esnasında ve sonrasında,

KULLANIMI ŞEKLİ

Siğir, koyun-keçi ve atlarda klasik genel doz olarak ton içme suyuna 1 L katılır. Kanatlılarda 1 ton içme suyuna 1-2 L katılarak 3-5 gün boyunca kullanılır. Pratikte hayvan başına içme suyuna ilave edilerek; Siğirlerde: 25-50 ml, Buzağılarda: 5ml Koyun-Keçilerde: 2.5-5 ml Kuzu ve oğlaklarda: 1-2 ml uygulanır. Atlarda: 50 ml 7-10 gün boyunca uygulanır, yarış öncesi dozaj atlarda 100 ml'ye kadar çıkarılır. Anılarda: İlkbahar ve sonbaharda 50ml/50L besleme şurubuna katılır. Hayvan veya sürünün genel durumuna bağlı olarak; siğir, koyun ve keçilerde ürünün uygulama süresi veteriner hekim tarafından belirlenir.

Ticari Takdim Şekli: 100 GR - 250 GR - 500 GR - 1 L ve 5 L'lik plastik şişe ve bidon ambalajlarda sunulmaktadır.
BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER

	Her Litrede
L-ALANINE	10.000 MG/L
L-ARGININE	15.000 MG/L
L-ASPARAGINE	500 MG/L
L-ASPARTIC ACID	5.000 MG/L
L-CYSTEINE	7.000 MG/L
L-GLUTAMIC ACID	25.000 MG/L
L-GLUTAMINE	5.000 MG/L
GLYCINE	15.000 MG/L
L-ISOLEUCINE	10.000 MG/L
L-LEUCINE	20.000 MG/L
L-LYSINE	10.000 MG/L
L-METHIONINE	20.000 MG/L
L-PHENYLALANINE	15.000 MG/L
L-PROLINE	10.000 MG/L
L-SERINE	10.000 MG/L
L-THREONINE	15.000 MG/L
L-TRYPTOPHAN	2.000 MG/L
L-TYROSINE	550 MG/L
L-VALINE	20.000 MG/L
ÇİNKO	10.000 MG/L
BAKIR	5.000 MG/L
DEMİR	10.000 MG/L
MANGAN	10.000 MG/L
SODYUM	5.000 MG/L
POTASYUM	5.000 MG/L
SİTRİK ASİT	2.500 MG/L
PROPİLEN GLİKOL	50.000 MG/L
M.O.S.	10.000 MG/L
AROMA	5.000 MG/L
SU	q.s.p. MG/L
ALANİN	
ARJİNİN	
ASPARAJİN	
ASPARTİK ASİT	
SİSTEİN	
GLUTAMİK ASİT	
GLUTAMİN	
GLİSİN	
İZOLÖSİN	
LÖSİN	
LİZİN	
METİYONİN	
FENİLALANİN	
PROLİN	
SERİN	
TREONİN	
TRİPTOFAN	
TİROZİN	
VALİN	
ÇİNKO GLİSİN ŞELAT	
BAKIR GLİSİN ŞELAT	
DEMİR GLİSİN ŞELAT	
MANGAN GLİSİN ŞELAT	
SODYUM BENZOAT	
POTASYUM SORBAT	
SİTRİK ASİT ANHİDRAT	
MONO PROPİLEN GLİKOL	
MANNAN OLİGO SAKKARİT	
KAVUN AROMASI	
DEİYONİZE SU	



BAKOVIT JEL



VİTAMİN MINERAL PREMİKS

KULLANIM AMACI

Hayvanlarda vitamin mineral ihtiyacını gidermek amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Buzağılarda : 3 Pompa
Kuzularda : 1 Pompa
Koyunlarda : 2 Pompa
İneklerde : 7 Pompa
Kanatılarda : 5 Pompa (1 Lt. suya)

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILMAZ.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

Vitamin D3 ile D2 bir anda kullanılamaz.

İÇERİKLER	Her Litrede
VİTAMİN E	50.000 MG/L
BAKİR ASETAT	10.000 MG/L
ÇİNKO ASETAT	20.000 MG/L
DEMİR ASETAT	15.000 MG/L
MANGAN ASETAT	20.000 MG/L
KOBALT Klorür	1.000 MG/L
POTASYUM İYODAT	500 MG/L
ORTO FOSFORİK ASİT	20.000 MG/L
SODYUM SELENİT	225 MG/L
KALSİYUM ASETAT	10.000 MG/L
MAGNEZYUM ASETAT	10.000 MG/L
AROMA	ÇİLEK MG/L
GLİSERİN	q.s.p. MG/L

SELEJEL AD₃E



VİTAMİN SELENİYUM PREMİKS

KULLANIM AMACI

Hayvanlarda vitamin selenyum ihtiyacını gidermek amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Buzağılarda : 3 Pompa
Kuzularda : 1 Pompa
Koyunlarda : 2 Pompa
İneklerde : 7 Pompa
Kanatılarda : 5 Pompa (1 Lt. suya)

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILMAZ.

Vitamin D2 ile birlikte kullanılamaz.

İÇERİKLER	Her Litrede
VİTAMİN A	5.000.000 IU/L
VİTAMİN E	50.000 MG/L
VİTAMİN D3	1.000.000 IU/L
SODYUM SELENİT	225 MG/L
AROMA	ÇİLEK MG/L
GLİSERİN	q.s.p. MG/L



HYDRALYTE



ELEKTROLİT DENGELİYİCİ PREMİKS

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI

İnek, Buzağı, Koyun, Kuzu, Keçi, Oğlak, Tavuk, civciv, güvercin, hindi ve muhabbet kuşu gibi hayvanların elektrolit açığının dengeleyici olarak kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Kullanım esnasında dozajlama kolaylığı sağlar.

Buzağının sağlıklı kalmasını sağlar ve onların gelişimini destekler.

Güçlü bağışıklık sağlar.

Enerji ve mineral kaynakları ile destekler.

Elektrolit dengesini sağlamada kullanılır.

Nakil ve stres durumlarında düşen direncin artırılmasını destekler. İçerisindeki probiyotikler ile bağırsak florasını yeniden düzenler ve sindirimin yeniden aktif hale gelmesini destekler.

50 gr Hydralyte Tablet 2 lt ılık suda 42° derece çözündürülerek dehidrasyon başlangıcında günde 2 kez kullanılır.

2-4 gün süreyle de hidrasyonun şiddetine göre kullanılır.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER (Her 50 gr' da)

ELEKTROLİTLER		
11.4.1	SODYUM KLORÜR	3.40 G
11.5.1	POTASYUM KLORÜR	1.10 G
11.4.2	SODYUM BİKARBONAT	3.35 G
AMİNO ASİTLER		
	GLİSİN	2.50 G
KARBONHİDRATLAR		
8.9.1	LAKTOZ MONOHİDRAT	33.8 G
TEKNOLOJİK KATKILAR		
E330	SİTRİK ASİT	4.55 G
BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİ	ENTEROCOCUS FACEUM	1.25 G
4b1705		
AROMA	VANİLİN AROMASI	0.0.1 G



MULTIFORM



VİTAMİN MİNERAL PREMİKS

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI

- Tavuklarda ve Diğer Kümes Hayvanlarında: Destekleyici olarak;
- Vitamin noksanlığı verimin artırılması ,
- Hızlı büyüme dönemlerinde,
- Yumurtada en yüksek verim düzeyine çıkışta,
- Yüksek metabolik aktivite döneminde,
- Vücut direncinin yükseltilmesi,
- Sağlığın ve verimin korunması,
- Nakil, gaga kesimi, yem değişikliği, ısı stresi, ani iklim değişikliği, stres durumları, strese bağlı vücut direncinin artırılması.
- Sağlıklı gelişme ve hızlı büyümenin sağlanması,
- Gebelik döneminde vitamin eksikliği çeken hayvanlardan doğan yavrualarda,
- Süt emme döneminde hastalıklarla artan vitamin ihtiyacı, iştahsızlık nedeniyle sütle alınamayan vitaminlerin telafisi,

KULLANIMI ŞEKLİ

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmediği sürece: 1 Litre içme suyuna 2-3 gr 1 ton içme suyuna 2-3 kg olacak şekilde kullanılır.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

VİTAMİNLER (Her 2,5 kg'de)

VİTAMİN A	15.000.000 IU
VİTAMİN D3	2.500.000 IU
VİTAMİN E	30.000 MG
VİTAMİN K3	4.000 MG
VİTAMİN B1	3.000 MG
VİTAMİN B2	7.000 MG
VİTAMİN B6	5.000 MG
VİTAMİN B12	15 MG
VİTAMİN C	50.000 MG
NIACIN	30.000 MG
CAL-D-PANTOTHANATE	10.000 MG
D-BIOTIN	45 MG
FOLIC ACID	1.000 MG
CHOLINE CHLORIDE	200.000 MG
CANTHAXANTHIN	1.000 MG
MANGAN	80.000 MG
DEMİR	60.000 MG
ÇİNKO	60.000 MG
BAKIR	5.000 MG
İYOT	1.000 MG
KOBALT	200 MG
SELENYUM	150 MG
ANTİOKSIDAN	10.000 MG



AMINO SHOCK POWDER



VİTAMİN MİNERAL AMİNO ASİT PREMİKS

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI

Tavuk, civciv, güvercin, hindi ve muhabbet kuşu gibi hayvanların vitamin, mineral ve aminoasit açığının karşılanmasında kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Her 1 lt suya 2,5 gr. katılarak kullanılır. Hayvan ve sürünün genel durumuna bağlı olarak Tavuk, civciv, güvercin, hindi ve muhabbet kuşlarda ürünün uygulama süresi veteriner hekim tarafından belirlenebilir.

Depolama Şekli: Serin, kuru, ışsız ve havalandırılabilen ortamda saklanmalıdır.

Ticari Takdim Şekli: 100 GR - 1 L'lik plastik şişe ve bidon ambalajlarda sunulmaktadır.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

İÇERİKLER (Her 1.000 gr' da)

VİTAMİN A	240.000 IU/GR	L-ALANİNE	12.000 MG/KG
VİTAMİN D3	50.000 IU/GR	L-ASPARTIC ACID	5.600 MG/KG
VİTAMİN E	600 MG/KG	L-CARNITINE	3.600 MG/KG
VİTAMİN K3	80 MG/KG	L-CYSTEINE	6.400 MG/KG
VİTAMİN B1	60 MG/KG	L-GLUTAMIC ACID	37.600 MG/KG
VİTAMİN B2	140 MG/KG	L-GLUTAMINE	13.600 MG/KG
VİTAMİN B6	100 MG/KG	GLYCINE	26.000 MG/KG
VİTAMİN B12	1 MG/KG	L-ISOLEUCINE	18.800 MG/KG
VİTAMİN C	1.000 MG/KG	L-HISTIDINE	2.400 MG/KG
NİACİN	600 MG/KG	L-LEUCINE	27.200 MG/KG
CAL-D-PANTOTHANATE	200 MG/KG	L-LYSINE	18.800 MG/KG
D-BİOTİN	1 MG/KG	L-METHIONINE	8.000 MG/KG
FOLIC ACID	20 MG/KG	L-ORNITHINE	2.400 MG/KG
CHOLINE CHLORIDE	4.000 MG/KG	L-PHENYLALANINE	9.600 MG/KG
MANGAN	1.600 MG/KG	L-PROLINE	13.200 MG/KG
DEMİR	1.200 MG/KG	L-SERINE	16.400 MG/KG
ÇİNKÖ	1.200 MG/KG	L-SELENO METHIONINE	200 MG/KG
BAKİR	100 MG/KG	L-THREONINE	25.600 MG/KG
İYOT	20 MG/KG	L-TRYPTOPHAN	7.600 MG/KG
AROMA	5.000 MG/KG	L-TYROSINE	2.000 MG/KG
L-ARGININE	43.200 MG/KG	MANNAN OLİGO SAKKARİT	600.000 MG/KG



HEPA - L CARNITINE



KARACİĞER DESTEKLEYİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

At, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlarda enerji kaynağı, sindirim -destekleyici ve hayvanlarda metionin, lizin, niasin ve betain ihtiyacını karşılamak amaçlı hazırlanmış bir kombinasyondur. Karaciğer destekleyici olarak kullanılır. Özellikle süt verimi yüksek ineklerde geçiş döneminde şekillenen, infertiliteye hatta ölüme sebep olabilen ketozisin, yağlı karaciğer sendromu - ve gebelik toksemisinin tedavisinde kullanılır. Doğum sonrası ineklerde enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Ruminant ve atlarda günlük 250 ml su veya yeme ilave edilerek kullanılır. Diğer tavsiye edilen kullanım şekli düzenli kullanımlarda 1 ton içme suyuna 1 lt ilave edilerek kullanılır.

Ticari Takdim Şekli: 500 ml, 1 lt, 5 lt plastik ambalajlarda satışa sunulmaktadır. BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇİNDEKİLER	Her Litrede
KARNİTİN	L-CARNİTİNE BASE (%98) 25.000 MG/L
ENGİNAR	CYNARA SCOLYMUS 1.400 MG/L
DEVE DİKENİ	SILYBUM MARIANUM 950 MG/L
SODYUM	SODYUM BENZOAT 5.000 MG/L
POTASYUM	POTASYUM SORBAT 5.000 MG/L
AROMA	KAVUN AROMASI 2.000 MG/L
SU	DİOYONİZE SU q.s.p. MG/L

PROCİNE FRESH



DOĞUM SONRASI DESTEKLEYİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

At, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlarda niasin ve enerji ihtiyacını karşılamak amaçlı hazırlanmış bir kombinasyondur. Karaciğer destekleyici olarak da kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Ruminant ve atlarda günlük 250 ml su veya yeme ilave edilerek kullanılır. Diğer tavsiye edilen kullanım şekli düzenli kullanımlarda 1 ton içme suyuna 1 lt. ilave edilerek kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ

İÇİNDEKİLER	Her Litrede
MONO PROPİLEN GLİKOL	1,2 PROPANEDİOL GLYCOL 600.000 MG/L
GLİSEROL	1,2,3-PROPANETRIOL 200.000 MG/L
SORBITOL	D-GLUCİTOL 150.000 MG/L
VİTAMİN B3	NİASİN %99 10.000 MG/L
SU	DEİYONİZE SU 40.000 MG/L



RUMENSACC BALANCE



SİNDİRİM SİSTEMİ DÜZENLEYİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Siğır, koyun ve keçilerde organik ve metabolik dengesizlikler, sebebi tam olarak bilinmeyen ermenlerden ileri gelen rumenal sindirim bozukluklarının giderilmesi, bozulmuş ve aşırı küflü, yüksek oranda üre ve benzeri azotlu maddelerle desteklenmiş yemler ile kötü muhafaza edilmiş silaj tüketiminden kaynaklanan sindirim bozuklukları; mikrobiyotik dengesizlikleri, ani rasyon değişikliğinden kaynaklanan sindirim bozuklukları, rumen mikrobiyotasının bozulmasıyla oluşan dengesizlikleri düzenler.

- Büyükbaş hayvanlarda aşırı karbonhidrat ve protein tüketimine bağlı atoni, asidozis ve alkalozis olguları,
- Ani rasyon değişikliklerine bağlı rumen hareketleri ve sindirim sistemi bozuklukları,
- Ateşli ve enfeksiyöz hastalıklara bağlı ön mide durgunlukları,
- Organik ve metabolik rahatsızlıklar,
- Sindirim sisteminde yaşanan sıkıntıların giderilmesinde ve içeriğindeki yüksek miktardaki maya ile yemden yararlanma, günlük canlı ağırlık artışı sağlanması amacıyla kullanılır.
- Buzağılarda 8-14. haftalarda rumen gelişimini hızlandırma

KULLANIMI ŞEKLİ

Tavsiye edilen kullanım şekli 1 lt içme suyuna veya yemine günde 1 kez 100 gr ilave edilerek kullanılır.

- Tüm endikasyonlarda yeme karıştırılarak uygulanır veya ılık suda (25-35 °C) eritilerek içirilir.
- Süt siğirilerine: Günlük 100 gr veya günde iki kez 50 g 3-5 gün süreyle,
- Besi siğirilerine : Günlük 50 gr veya günde 2 kez 25 g 3-5 gün süreyle,
- Koyun ve keçilere : Tek seferde 30 g 3-5 gün süreyle uygulanır
- Atlara: Tek seferde 50 g 3-5 gün süreyle verilir.

VİTAMİNLER

VİTAMİN B1	TIAMİN	600 mg
VİTAMİN B2	RİBOFLAVİN	600 mg
VİTAMİN B6	PRİDOKSİN	600 mg
VİTAMİN B12	SIYANOKOBALAMİN	2 mg
KOLİN	KOLİN KLORİD	10.000 mg/kg

3a ELEKTROLİTLER

SODYUM	BİKARBONAT	470.000 mg
--------	------------	------------

AMİNO ASİTLER

METHİONİN	DL-METHİONİN	1000 mg
LİZİN	DL-LİZİN	1000 mg

3c301 KORUYUCULAR

KALSİYUM	PROPIYONAT	20.000 mg
----------	------------	-----------

E.282 FLORA DÜZENLEYİCİLER

SACC. CERV.	AKTİF MAYA	50.000 mg/kg
SACC. CERV.	MAYA EKSTRAKTİ	15.000 mg/kg
SACC. CERV.	İNAKTİF MAYA	200.000 mg/kg
ENTEROCOCUS FACEUM	ENTEROCOCUS FACEUM Ncimb	qsp
	10415 3.6 X10 ¹² CFU/gr	

TAŞIYICILAR

MAGNEZYUM	MAGNEZYUM OKSİT	qsp
KALSİYUM	KALSİYUM KARBONAT	qsp



ELECTROLYTES ENERGY



PROBİYOTİK AMİNO ASİT KATKILI ELEKTROLİT DENGELİYİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Electrolytes Energy Buzağı ishallerinde elektrolit dengesini sağlamak, enerji ve protein ihtiyacını karşılamak, bağırsak sisteminde probiyotiklerle villusları kaplayarak patojenlerin etkisini azaltmak amacıyla kullanılır. Tüm hayvan türlerinde çeşitli nedenlere bağlı enfeksiyöz veya nonspesifik gastroenteritler, ishal, inatçı kusma gibi durumlarda şekillenen sıvı - elektrolitlerin kayıplarının yerin

KULLANIMI ŞEKLİ

Veteriner Hekim tarafından başka bir şekilde tavsiye edilmedi ise: 1 Poşet (100 gr) Electrolytes Energy 2 litre ılık su ile (45 c) karıştırılarak verilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ:

50 gr ve 100. 250, 500 gr'lık çift katlı kağıt ve polipropilen alüminyum torbalarda veya şişelerde.

Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

İÇERİKLER (Her 1.000 gr' da)

SODYUM KLORÜR	50.000 MG/KG
POTASYUM KLORÜR	50.000 MG/KG
SODYUM Bİ KARBONAT	155.000 MG/KG
LAKTOZ MONOHİDRAT	550.000 MG/KG
L-GLUTAMİK ASİD	30.000 MG/KG
BETA GLUCAN % 40	5.000 MG/KG
GLİSİN	50.000 MG/KG
M.O.S.	2.000 MG/KG
SİTRİK ASİT ANHİDRİ	100.000 MG/KG
ENTEROCOCUS FACEUM 1*10 ⁹ CFU/GR	1.000 MG/KG
TEREYAĞLI VANİLİN AROMA	7.000 MG/KG



TURBOVİT



VİTAMİN PREMİKS

KULLANIM AMACI

Hayvanlarda vitamin eksikliğinin giderilmesi amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Siğir, koyun-keçi ve atlarda klasik genel doz olarak ton içme suyuna 1 L katılır. Kanatlılarda 1 ton içme suyuna 1-2 L katılarak 3-5 gün boyunca kullanılır.

Pratikte hayvan başına içme suyuna ilave edilerek;

Siğirlerde: 15-30 ml

Buzağılarda: 3-5ml

Koyun-Keçilerde: 2-4 ml

Kuzu ve oğlaklarda: 1-2 ml uygulanır.

Hayvan ve sürünün genel durumuna bağlı olarak siğir, koyun ve keçilerde ürünün uygulama süresi veteriner hekim tarafından belirlenebilir.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışıksız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER	Her Litrede
VİTAMİN A	2.500.000 IU/L
VİTAMİN D3	250.000 IU/L
VİTAMİN E	2.500 MG/L
VİTAMİN K3	500 MG/L
VİTAMİN C	5.000 MG/L
VİTAMİN B1	1.000 MG/L
VİTAMİN B2	1.250 MG/L
VİTAMİN B3	7.500 MG/L
VİTAMİN B5	2.500 MG/L
VİTAMİN B6	500 MG/L
VİTAMİN B7	10 MG/L
VİTAMİN B9	250 MG/L
VİTAMİN B12	3 MG/L
SODYUM BENZOAT	5.000 MG/L
POTASYUM SORBAT	5.000 MG/L
SİTRİK ASİT	2.500 MG/L
MONO PROPİLEN GLİKOL	100.000 MG/L
DEİYONİZE SU	q.s.p. MG/L



IMMUNO DIRENCH JEL



GALAKTOZAMİN BETA GLUKAN - MOS PREMİKS

KULLANIM AMACI

Buzağların bağışıklık sistemi ve sindirim sistemini güçlendirmek amacı ile kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Tavsiye edilen kullanım şekli Buzağlarda günde 2 defa 10 ml / 5 gün, bağışıklık sistemi için günde 2 defa 6 ml / 10 gün, destek amaçlı günde 2 defa 4 ml / 60 gün kullanılması tavsiye edilir.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanınız.

ELEMENTLER

CROPPER	CROPPER	4.250 mg/kg
MAGNESIUM	MAGNESIUM	290 mg/kg
POTASSIUM	POTASSIUM	2.425 mg/kg
SODIUM	SODIUM	850 mg/kg
CALCIUM	CALCIUM	390 mg/kg
PHOSPHOROUS	PHOSPHOROUS	990 mg/kg

İZ ELEMENTLER

3c301	METHIONIN	DL-METHIONIN	500 mg/kg
3c2.1	LIZIN	L-LIZIN	1.800 mg/kg
3c3.1	TREONIN	L-TREONIN	1.420 mg/kg
3c3.6.1	ARJININ	L-ARJININ	1.000 mg/kg
3c391	SİSTİN	L-SİSTİN	300 mg/kg
	GLUTAMİK ASİT	L-GLUTAMİK ASİT	4.000 mg/kg

İZ ELEMENTLER

ASPARTİK ASİT	L-ASPARTİK ASİT	3.200 mg/kg
ALANIN	L-ALANIN	2.400 mg/kg
GLİSİN	L-GLİSİN	1.200 mg/kg
TRİPTOFAN	L-TRİPTOFAN	240 mg/kg
HİSTİDİN	L-HİSTİDİN	600 mg/kg
PROLİN	L-PROLİN	1.400 mg/kg
SERİN	L-SERİN	1.300 mg/kg
FENİLALANİN	L-FENİLALANİN	1.400 mg/kg
VALİN	L-VALİN	1.340 mg/kg
İZOLOZİN	L-İZOLOZİN	1.300 mg/kg
TİROZİN	L-TİROZİN	1.300 mg/kg
LÖSİN	L-LÖSİN	2.100 mg/kg

TAŞIYICILAR

SU (H ₂ O)	SU (H ₂ O)	qsp
-----------------------	-----------------------	-----



COPPER VİT B12



BAKIR VİTAMİN PREMİKS

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI

Hayvanlarda Bakır ve B12 vitamin ihtiyacını gidermek amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Buzağılarda: 3 Pompa, Kuzularda: 1 Pompa, Koyunlarda: 2 Pompa, İneklerde: 7 Pompa, Kanatlılarda : 5 Pompa (1 Lt. suya) yemine veya suyuna katılarak kullanılır.

Depolama Şekli: Oda sıcaklığına serin, kuru, ışsız ortamda saklanmalıdır.

Ticari Takdim Şekli: 100 GR - 250 GR - 500 GR - 1 L ve 5 L'lik plastik şişe ve bidon ambalajlarda sunulmaktadır.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

UYARILAR:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

İÇERİKLER		Her Litrede
BAKIR	BAKIR ASETAT	25.000 MG/L
METHION	DL-METHIONINE	20.000 MG/L
KOBALT	KOBALT KLORÜR	1.000 MG/L
VİTAMİN B12	SIYANOKOBOLAMİN	50 MG/L
SU	DİYONİZE SU	q.s.p.



DEPOSOLL LIQUID



MİNERAL VE KALSİYUM PREMİKS

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI

Atlar: Yarış ve antrenman sonrası terlemeye kaybedilen mineral kaybını kompanse eder. Stresli ve aşırı efor gerektiren durumlarda magnezyum desteği sağlar. Kas iskelet sisteminin sağlıklı gelişimini sağlayarak koşu performansını artırır. Tırnak keratinizasyonuna destek olur.

Ruminantlar: Genç hayvanlarda gelişmeyi hızlandırır, günlük canlı ağırlık artışını yükseltir. Neonatal ve enzootik ataksilere karşı koruma sağlar. Yemden yararlanmayı artırır. Et ve süt verimini artırır. Strese karşı koruma sağlar. Gebelik ve laktasyonda artan mineral ihtiyacını karşılar. Pika hastalığına karşı korur. Beyaz kas hastalığına karşı korur. Raşizmi ve osteomalaziye engeller.

Kanatlı: Yemden yararlanma oranını yükseltir. Yumurta kabuğunu güçlendirir. Kanibalizmi önler. Eksudatif diyetez, taşlık nekrozu ve perozisten korur. Yumurtacılarda kafes yorgunluğu önler. Tüy dökümü sonrası mineral madde desteği sağlar. Dehidrasyon ve diyare durumlarında mineral madde desteği sağlar. Aşılama, gaga kesimi ve bakliyelere bağlı stresi azaltır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Deposoll Liquid oral çözelti hayvanların içme sularına her gün taze olarak katılmak suretiyle uygulanır. Suda kolayca çözünüp homojen bir dağılım sağlar. Uygulama hayvanların genel durumlarına göre ve veteriner hekimin tavsiyesine göre 3-7 gün sürdürülebilir, her ay tekrarlanabilir.

Ticari Takdim Şekli: 1L, 5L ve 20'lik plastik şişe ve bidon ambalajlarda sunulmaktadır.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İDEAL SAKLAMA KOŞULLARI:

Güneş görmeyen serin ve ağız kapalı muhafaza edilmelidir.

Besi Sığırları	20 ml	100 kg c.a	gün
Gebeler ve laktasyondaki inekler	30 ml	100 kg c.a	gün
Buzagılar	15 ml	gün	
Koyun ve keçiler	10 ml	gün	
Gebe koyun ve keçiler	15 ml	gün	
Atlar	30 ml	100 kg c.a	gün
Kuzu ve oğlaklar	5 ml	gün	

BİLEŞİMİ	
BESİNSEL YEM KATKI MADDELERİ	
İZ ELEMENTLER:	
DEMİR (DEMİR KLORİD-E-1)MANGAN (MANGAN KLORİD-E-5)	1.500 mg/L
ÇİNKÖ (ÇİNKÖ KLORİD-E-6)	3.000 mg/L
BAKİR (BAKİR KLORİD-E-3)	1.000 mg/L
KOBALT (KOBALT KLORİD-E-3)	20 mg/L
SELENYUM (SELENYUM SELENİT - E8)	5 mg/L
TEKNOLOJİK YEM KATKI MADDELERİ	
KORUYUCU	
FOSFOR (ORTOFOSFORİK ASİT - E338)	30.000 mg/L
DUYUSAL YEM KATKI MADDELERİ	
DİĞER RENKLENDİRİCİLER,	
PONCEAU 4R ET24	100 mg/L
MİNERALLER VE BUNLARDAN ELDE EDİLEN ÜRÜNLER	
KALSİYUM (KALSİYUM KLORÜR 11.1.6)	30.000 mg/L
SODYUM (SODYUM KLORÜR 11.4.1)	3.000 mg/L
MAGNEZYUM (MAGNEZYUM KLORÜR 11.2.6)	3.000 mg/L
AMİNO ASİTLER	
L-LİZİN	5.000 mg/L
DL-METİYONİN	10.000 mg/L
TAŞIYICI	
SU	1 l'ye tamamlanır



PROSÜR



FLORA DÜZENLEYİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Hayvanlarda bağırsak florasını düzenlemek için kullanılan bitkisel yem katkısıdır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Büyükbaş hayvanların yemine veya suyuna 100 gr. ilave edilerek kullanılır. Koyunlarda ise 10 gr. ilave edilerek kullanılır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

50-100 gr. ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇİNDEKİLER

	Her KG'da
RHAMMUS CATORTICUS EKSTRAK	40.000 MG/KG
SENNÆ OFFICINALIS EKSTRAKTI	200.000 MG/KG
PIMPINELLA ANISUM EKSTRAKTI	100.000 MG/KG
CUMINUM CYMINUM EKSTRAKTI	50.000 MG/KG
LINUM USITATISSIMUM EKSTRAKTI	100.000 MG/KG
MG SÜLFAT	q.s.p. MG/KG

CARBO ACTIVE



TOKSİN BAĞLAYICI PREMİKS

KULLANIM AMACI

Hayvanlarda toksin bağlayıcı ve sindirim sistemi düzenleyici olarak kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Tavsiye edilen kullanım şekli hayvan başı günlük 15 gr. yemine veya suyuna katılarak kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

ÜRÜN İÇERİĞİ

%10 MOS, %10 Bitkisel Kömür ve Doğru maddesi Klinoptolit ihtiva eder.







SELDE CARLSBAD



MİNERAL PREMİKS

KULLANIM AMACI

Koyun, keçi, siğir, at, köpek ve kedilerde yemden yararlanmayı artırır. Rumen Ph'sını düzenler.

KULLANIMI ŞEKLİ

10 kat su veya yem ile karıştırılarak kullanılmaktadır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 / 250 / 500 gr. ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇİNDEKİLER

11.4.1	KLOR	SODYUM KLORÜR	10.000	MG/KG
11.5.2	MAGNEZYUM	MAGNEZYUM SÜLFAT	20.000	MG/KG
11.4.2	SODYUM	SODYUM Bİ KARBONAT	430.000	MG/KG
11.4.6	SODYUM	SODYUM SÜLFAT	540.000	MG/KG

MAGNEZYUM SÜLFAT



MİNERAL PREMİKS

KULLANIM AMACI

Koyun, keçi, siğir, atlarda magnezyum ve sodyum ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

10 kat su veya yem ile karıştırılarak kullanılmaktadır.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 / 250 / 500 gr. ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇİNDEKİLER

11.4.1	Klorür	Sodyum klorür	10.000	mg/500g
11.5.2	Magnezyum	Magnezyum sülfat	490.000	mg/500g

MAGNESİA CALSİNE



MİNERAL PREMİKS

KULLANIM AMACI

Koyun, keçi, siğir ve atlarda Mide Ph'sini düzenlemek amacı ile kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Dana: 15-25 gr/gün - Siğir 40-60 gr/gün - Koyun Keçi: 15-25 gr/gün, yem ve suya ilave edilir.

TİCARİ TAKDİM ŞEKLİ

100 / 250 / 500 gr. ambalajlarda satışa sunulmaktadır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇİNDEKİLER

11.4.2 Sodyum	Sodyum bi karbonat	40.000 mg/kg
11.2.1 Magnezyum	Magnezyum oksit	900.000 mg/kg
11.4.1 Kalsiyum Karbonat	Kalsiyum Karbonat	60.000 mg/kg

HİNT YAĞI



HİNT RHUBARBI YAĞI PREMİKS

KULLANIM AMACI

Hayvanların enerji ihtiyacına yardımcı olmak amaçlı kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Koyun-Keçi; 5 ml - 15 ml
Siğir; 500 ml - 1000 ml
Dana-Tay; 50 ml - 100 ml
At; 250 ml - 500 ml
Köpeklerde; 5 ml - 25 ml
Kedilerde; 2 ml - 5 ml

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Tarımla ilaçlarından uzakta muhafaza ederek bulaşmasını engelleyiniz. Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇİNDEKİLER

Hint rhubarbı Yağı	Hint rhubarbı Yağı	999.980 mg/L
Vitamin E	A.Tokoferol Asetat	20 mg/L



PARAFİN LİQUİD



SİNDİRİM SİSTEMİ DÜZENLEYİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Hayvanların sindirim sistemini düzenleme ve E vitamini ihtiyacını gidermek amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Koyun-Keçi; 50 ml - 100 ml
Sığır; 250 ml - 500 ml
Dana-Tay; 50 ml - 100 ml
At; 250 ml - 500 ml
Köpeklerde; 5 ml - 25 ml
Kedilerde; 2 ml - 5 ml

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Tam ilaçlarından uzakta muhafaza ederek bulaşmasını engelleyiniz. Açılmış ambalajları kısa sürede kullanınız. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILMAZ.

İÇİNDEKİLER

Parafin Likit	Parafin Likit	999.980 mg/L
Vitamin E	A.Tokoferol Asetat	20 mg/L



PROVİT A-K



VİTAMİN MİNERAL DENGELEYİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Cıvcıv, Piliç, Tavuk, Hindi ve diğer kümes hayvanlarında A ve K vitamini takviyesi için gerekli olan diğer hastalık ve problemlerde tedaviye destek amaçlı kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Ton içme sularının içine 250 gr (Litresine 0.25 gr) katılıp iyice karıştırılarak verilir. Ürün Güvenliği Bilgileri; Evcil hayvanlarda bilinen hiçbir yan etkisi yoktur, ancak hayvanlara aşırı vitamin yüklenmesine yol açabilecek doz aşımından sakınılması gerekir. Tarım ilaç ve gübrelerinden uzakta muhafaza ediniz. Hedef türler haricinde kullanılması tavsiye edilmez.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

10 Kg'de

Tanımlayıcı Numara/ Identifier Number	Aktif Madde/ Active Substance	Katkı Adı/ Additive Name	Premiksdeki Düzye/Level in Premix	Birimler/ Units
Vitaminler / Vitamins				
E 672	Vitamin A	Retinol Asetat / Retinol Acetate	20,000,000	IU
E 160a	Vitamin K3	Sentetik Menadion / Synthetic Menadione	8,000	mg
E 300	Vitamin C	Askorbik Asit/Ascorbic acid	1,000	mg
Taşıyıcılar / Carriers				
	Dekstroz Monohidrat (Mısır Şekeri)	Dekstroz Monohidrat (C6H8O7.H2O)	200,000	mg
	Kalsiyum / Calcium (Ca)	Kalsiyum Karbonat / Calcium Carbonate (CaCO3)	qsp	

PROVİT E-SE



VİTAMİN MİNERAL DENGELEYİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Evcil hayvanların (Cıvcıv, Piliç, Tavuk; Hindi, Buzağı, Kuzu, Oğlak ve Sağmal Hayvanlar) Vitamin E ve Selenyum ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kullanılır. Büyükbaş hayvanlarda Vitamin E eksikliğine bağlı kızgınlık ve östrus tedavisinde destek amaçlı kullanılabilir.

KULLANIMI ŞEKLİ

400 Lt içme sularının içine 100 gr (1 Paket) katılıp iyice karıştırılarak verilir. 10 adet Kuzu-Oğlak, 2 adet buzağıya günde 5 gr gelecek şekilde suyla karıştırılarak içirilebilir.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

10 Kg'de

Tanımlayıcı Numara/ Identifier Number	Aktif Madde/Active Substance	Katkı Adı/Additive Name	Premiksdeki Düzey/ Level in Premix	Birimler/ Units
Vitaminler / Vitamins				
3a700	Vitamin E	Alfa Tokoferol Asetat/Alpha Tocopherol Acetate	30,000	mg
E 300	Vitamin C	Askorbik Asit/Ascorbic acid	1,000	mg
İz Elementler / Trace Elements				
E8	Selenyum/ Selenium (Se)	Sodyum Selenit / Sodium Selenite	5	mg
Taşıyıcılar / Carriers				
	Dekstroz Monohidrat (Mısır Şekeri)	Dekstroz Monohidrat (C6H8O7.H2O)	200,000	mg
	Kalsiyum / Calcium (Ca)	Kalsiyum Karbonat / Calcium Carbonate (CaCO3)	qsp	



CALF START PLUS



VİTAMİN MİNERAL AMİNO ASİT ÇÖZELTİ TOZU PREMİKS

KULLANIM AMACI

Yeni doğanlar da dahil, buzağı, kuzu ve oğlakların hızla büyüüp gelişme için gerekli olan çoğul iz mineral ve vitamin gereksiniminin karşılanması, çoğul iz mineral ve vitamin desteğinin güvenceye alınması, yeni doğanlar ve çok genç hayvanlarda yararlı sindirim sistemi mikrobiyasını hızla oluşturularak sağlıklı büyüme ve gelişmenin hızlandırılması, süt emenlerde ve genç ruminantlarda katı yeme geçiş aşamasının kısaltılması, kas ve iskelet sisteminin dengeli ve uyumlu bir şekilde gelişmesinin sağlanması, epitel doku bütünlüğünün korunması, mineral eksikliklerinden kaynaklanan metabolik bozuklukların düzeltilmesi, aşırı soğuk, sıcak, taşınma, gürültü, aşılama, ve stres olgularının önlenmesi ve sakıncasızca atlatılması, özellikle buzağı ishalleri olmak üzere, çeşitli enterik hastalıklarla birleşen sindirim sistemi bozukluklarının hızla düzeltilmesi, hastalıklara karşı vücut direncinin artırılması amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Calfstart Plus Çözelti Tozu, kuzu, buzağı ve oğlaklar ile besi sığırlarında günde bir kez olmak üzere; içme sularına, süte veya süt ikamelerine katılarak içirilmek suretiyle uygulanır. Buzağı, kuzu ve oğlaklarda: Üç haftalığa kadar olan buzağılara 5 g/gün, 1 aylıktan daha büyük buzağılara 10/gün dozlarında sürekli olarak verilir.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILMAZ.

İÇERİKLER

Vitamin A	Retinol Asetat (500.000 iu/gr)	1.000.000	Iu/gr	L-Lysine	Lizin	6.800	Mg/Kg
Vitamin D3	Cholecalciferol (500.000 iu/gr)	250.000	Iu/gr	L-Histidine	Histidin	600	Mg/Kg
Vitamin E	A tokoferol Asetat 50	2.000	Mg/Kg	L-Methionine	Metiyonin	2.000	Mg/Kg
Vitamin B1	Tiyamin HCL %99	600	Mg/Kg	L-Phenylalanine	Fenilalanine	2.400	Mg/Kg
Vitamin B2	Riboflavin Sodyum -5- Fosfat % 80	800	Mg/Kg	L-Proline	Prolin	3.300	Mg/Kg
Vitamin B3	Nikotinamid % 99	1.500	Mg/Kg	L-Serine	Serin	4.100	Mg/Kg
Vitamin B5	Kalsiyum D - Pantotenat % 99	300	Mg/Kg	L-Threonine	Treonin	6.400	Mg/Kg
Vitamin B6	Pridoksin HCL % 99	500	Mg/Kg	L-Tryptophan	Triptofan	1.900	Mg/Kg
Vitamin B7	D-Biyotin % 2	500	Mg/Kg	L-Tyrosine	Tirozin	500	Mg/Kg
Vitamin B9	Folic Acid	100	Mg/Kg	L-Selenomethionin	Selenyum	300	Mg/Kg
Vitamin B12	Siyanokobalamin % 1	50	Mg/Kg	Bakir	Bakir Lizin sülfat	6.000	Mg/Kg
Vitamin K3	Menadion Sodyum Bisülfat % 51	500	Mg/Kg	Çinko	Çinko Glisin şelat	25.000	Mg/Kg
L-Alanine	Alanin	3.000	Mg/Kg	Demir	Demir Glisin şelat	25.000	Mg/Kg
L-Arjinine	Arjinin	10.800	Mg/Kg	Mangan	Mangan Glisin şelat	25.000	Mg/Kg
L-Aspartic Acid	Aspartik asit	1.400	Mg/Kg	İyot	Kalsiyum İodat %62	100	Mg/Kg
L-Cystine	Sistein	1.600	Mg/Kg	Kolin	Kolin Klorit	10.000	Mg/Kg
L-Glutamic Acid	Glutamik asit	9.400	Mg/Kg	Kobalt	Kobalt II Asetat	20	Mg/Kg
L-Glutamine	Glutamin	3.400	Mg/Kg	M.O.S.	Mannan Oligo Sakkarit	800.000	Mg/Kg
Glycine	Glisin	6.500	Mg/Kg	Entereococcus	Entereococcus Faecium 1x10 ¹⁰ CFU/GR	1.000	Mg/Kg
L-Isoleucine	İzölosin	4.700	Mg/Kg	Aroma	Vanilya Aroması	25.000	Mg/Kg
L-Leucine	Lösin	6.800	Mg/Kg				



EDDI VITAL



MİNERAL BIOTİN VE İYOT TAKVİYESİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Hayvanlarda mineral, biotin ve iyot ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Hayvanlarda 10 kg yemine veya suyuna 30 gr. katılarak kullanılır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanınız.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

VİTAMİNLER

-	BIOTİN	BIOTİN	125 mg/kg
---	--------	--------	-----------

TAŞIYICI

-	INOAKTİF MAYA	INOAKTİF MAYA	50.000 mg/kg
E551b	KOLLEDIOL	SİLİKA	qsp

MİNERAL - İZ ELEMENT

E5	MANGAN	MANGAN GLİSİNİLİ ŞELAT	18.000 mg/kg
E1	DEMİR	DEMİR GLİSİNİLİ ŞELAT	18.000 mg/kg
E6	ÇİNKO	ÇİNKO GLİSİNİLİ ŞELAT	25.000 mg/kg
E4	BAKİR	BAKİR LİZİNİ SÜLFAT	1.600 mg/kg
E2	KALSİYUM	KALSİYUM İODAT	200 mg/kg
3b801	KOBALT I	KOBALT II ASETAT	40 mg/kg
3b8.11	SELENYUM	SELENO - METİYONİN	50 mg/kg
	İYOT	ETİLENDİDROKSİYOT (EDDI)	360 mg/kg



GLİSERİN LİQUİD



DOĞUM SONRASI ENERJİ VERİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Büyükbaş hayvanların doğumdan sonra açığa çıkan enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Karaciğer tarafından emilerek kandaki glikoz seviyesini artırır. Ketozeze karşı koruyucudur.

KULLANIMI ŞEKLİ

Doğumdan sonra 3-5 gün 300-500 gr/gün şeklinde kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Suya karıştırılarak kullanılır. Hedef tür haricinde kesinlikle kullanmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerlerde depolayınız. İçirme esnasında dikkatli olarak akciğer'e kaçmasını müdahale etmeyiniz.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER		1000 gr'da		
Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler
Emilgatorler-Stabilizatörler				
E484	Gliseril	Gliseril Polietilenglikol	95	%
	Su		5	%

PROPİLEN LİQUİD



DOĞUM SONRASI ENERJİ VERİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Büyükbaş hayvanların enerji ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kullanılır. Karaciğer tarafından emilerek kandaki glikoz seviyesini artırır. Ketozeze karşı koruyucudur. Yağlı karaciğer oluşumu riskini düşürür. Doğumdan önce ve sonraki dönemde kuru madde alımını artırarak verim seviyesini yükseltir.

KULLANIMI ŞEKLİ

Doğumdan önce 3-5 gün 300-500 gr gün / Doğumdan sonra 3-5 gün 300-500 gr gün şeklinde kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ

İÇERİKLER

Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Premiksdeki Düzey	Birimler
Emilgatorler-Stabilizatörler				
E477	Mono Propilen Glükol	Mono Propilen Glükol	% 90	mg/kg
E420	D-Sorbitol	D-Sorbitol	% 5	mg/kg
Taşıyıcılar				
	Diionize Su	Diionize Su	% 5	mg/kg



PROTOXX



DOĞAL MİNERAL PREMİKS

KULLANIM AMACI

Silika bazlı silis katmanlarından elde edilen porozif yapıda doğal mineral maddelerden oluşur. Tüm hayvan türlerinde ve tüm karma yemlerde mineral ihtiyacını karşılamak amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Yem silolarında ve yem hammaddelerinde 3-5 kg / ton yem hesabıyla kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışısız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ

İÇERİKLER

Tanımlayıcı Numara	Aktif Madde	Katkı Adı	Miktarı
Teknolojik Yem Katkı Maddeleri			
E 551c	Diatomite Earth	Diatomite Earth	985.000 mg/kg
	Lavandula Extraktı	Lavandula Extraktı	2.500 mg/kg
E 392	Rosmarinus Extraktı	Rosmarinus Extraktı	2.500 mg/kg
Dolgu Maddesi			
1g568	Klinoptilolit	Klinoptilolit	10.000 mg/kg



DERMAMASTI



MEME BAKIM JELİ

BİLEŞİMİ

DERMA MASTI 100 gr da 1 gr mentholihtiva eder. Yardımcı madde olarak cetilstearylalcohol, whiteoil, glycerin, stearicacid, glycerylstearathe, petrolatumjelly, triethanolamine ve su ihtiva eder. Yeşil renkte ve akışkan kıvamlı kompleks bir üründür.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

DERMA MASTI Büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda içerisinde bulundurduğu menthol sayesinde meme ve meme başı yangılarında tedaviye yardımcı olur. Mentholun ısıtıcı özelliğinden yararlanır. Gliserin ise meme derisinin beslenmesini ve nemlenmesini sağlar. Haricen kullanılan bir kremdir.

KULLANIM SAHASI

DERMA MASTI Küçükbaş ve büyükbaş hayvanların memede ve meme başı yangısı tedavisinde yardımcı ürün olarak kullanılır. Memeyi ısıtıcı ve rahatlatıcı özelliği vardır.

KULLANIMI ŞEKLİ

DERMA MASTI haricen olarak Meme lobuna sürülmek üzere 10 gr yedirilene kadar masaj yapılır. Bu işlem 3-4 gün süre ile uygulanır.

GENEL UYARILAR

Diğer ürünlerle karıştırılmamalıdır. Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır. Ürün çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.

KONTRAENDİKASYONLARI

Önerilen dozlarda kontraendikasyonu bulunmamaktadır. Doz aşımından kaçınılmalıdır.

DERMA CLOX



GÖZ BAKIM KREMLİ

DERMA CLOX 100 gr'ın 0,3 gr BoricAsid ve yardımcı madde olarak cetilstearylalcohol, White oil, glycerin, stearicacid, glycerylstearathe triethanolamine ve su ihtiva eder. Gri renkte koyu kıvamlı kompleks bir üründür.

FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLER

DERMA CLOX krem at, siğir, koyun, keçi ve köpeklerde borik asidin antiseptik özelliğinden faydalanarak deri ve özgün temizlenmesi için hazırlanmış bir üründür.

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI

DERMA CLOX krem siğir, at, koyun, keçi ve köpeklerde gözün temizlenmesi, göz hastalıklarının tedavisine yardımcı olmak, derinin temizlenmesi, oluşan yara ve yanıklarda tedaviye yardımcı olmak amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

DERMA CLOX krem göz çevresine sürülerek göz temizliği yapılır. Lezyonlu deri, yanık ve yaraların üstüne sürülerek bölgelerin temizliği yapılır. Günde en az 2 kere olmak üzere lezyonun durumuna göre tekrarlanır 3-4 gün süre ile devam edilir.

GENEL UYARILAR

Diğer ürünlerle karıştırılmamalıdır. Tavsiye edilen doz ve süre aşılmamalıdır. Ürün çocukların erişemeyeceği yerde saklanmalıdır.

İSTENMEYEN YAN ETKİLERİ

Kullanım şekline uyulduğu takdirde istenmeyen yan etki görülmez. Fakat deride oluşabilecek her hangi bir alerji durumunda kullanım derhal ve veteriner hekiminize başvurulmalıdır.

KONTRAENDİKASYONLARI

Önerilen dozlarda kontraendikasyonu bulunmamaktadır. Doz aşımından kaçınılmalıdır.

MUHAFAZA ŞEKLİ VE RAF ÖMRÜ

Kuru serin ve kuru bir yerde, direk güneş ışığından korunarak muhafaza edilmelidir. Raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

UYGULAYICININ ALMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Ürünün ağız bölgesine temasından kaçınılmalıdır. Temas halinde bol su ile yıkayınız. Buzağı, kuzu ve oğlaklarda: - 2 haftalığa kadar olan buzağılara 5 g/gün (1 ölçek) -20 baş kuzu ve oğlağa 5 g/gün (1 ölçek); - 2 la 3 hafta arasındaki buzağılara 7,5 g/gün (1,5 ölçek) -20 baş kuzu ve oğlağa 10 g/gün (2 ölçek); -3 Haftalıktan daha büyük buzağılara 10/gün (2 ölçek), -20 baş kuzu ve oğlağa 15 g/gün (3 ölçek)

Ticari Takdim Şekli: 5 gr, 10 gr, 15 gr, 20 gr'lık plastik enjektörle de satışı sunulmaktadır.



COMBİTAB-E



VİTAMİN MİNERAL PREMİKS

KULLANIM AMACI

Bakım ve beslenme yetersizliklerine bağlı olarak gelişen E vitamini, bakır, çinko, kobalt, mangan ve selenyum eksikliklerinin giderilmesinde kullanılır.

-Tırnak bozukluklarına karşı korunmada, ve meme başı bütünlüğünün sağlanmasında kullanılır.

-Toprak, taş, duvar, kemik ve benzeri yabancı cisimleri yeme-yalama (pika) gibi, mineral yetmezliğinin varlığını yansıtan durumlarda kullanılır.

-Genç hayvanlarda iskelet gelişimi ve immün sistemin desteklenmesinde kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Kuzu-oğlak, buzağı, koyun-keçi, besi danaları ve ineklerin 1 lt. içme suyuna aşağıda belirtilen sayıda tablet katılarak (eritilerek) kullanılır.

Kuzu-Oğlak	Doğumunun 2.gününde	1-2 tablet
	1 Hafta sonra	1-2 tablet
Buzağı	Doğumunun 2.gününde	3 tablet
	1 Hafta sonra	3 tablet
Koyun-Keçi	Koç katından 1 ay önce	2 tablet
	Gebeliğin 3.ayından sonra 2 gün, günde	1-2 tablet
Besi Danaları	3 ayda bir	2 tablet
	Çiftleşmeden 1 ay önce	3-4 tablet
İnekler	Gebeliğin 5.ayından sonra 2 gün, günde	3-4 tablet

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız. BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER

Her tablette

Vitaminler			
3a700	Vitamin E	Alfatokoferol asetat	1000 µg
İz elementler			
E4	Bakır	Bakır sülfat	10 mg
E6	Çinko	Çinko sülfat	15 mg
E3	Kobalt	Kobalt sülfat	12.5 mg
E5	Mangan	Mangan sülfat	10 mg
E8	Selenyum	Sodyum selenit	2.5 mg
	Kalsiyum	Dikalsiyum fosfat	250 mg
Dolgu Maddeleri			
	Laktoz monohidrat		100 mg
	Magnezyum stearat		5 mg
	Mısır nişastası		450 mg
Renklendirici			
E133	Brilliant Blue FCF		100 µg



VİTATAB



VİTAMİN PREMİKS

KULLANIM AMACI

Bakım ve beslenme yetersizliklerine bağlı olarak gelişen Vitamin A, Vitamin D3, Vitamin E, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B5, Vitamin B6, Vitamin B7, Vitamin B9, Vitamin B12, kalsiyum ve fosfor eksikliklerinin giderilmesinde kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Beslemeye bağlı vitamin, mineral ve aminoasit eksikliklerinin giderilmesinde kullanılır.

Kuzu ve oğlaklar da 1 tablet

Koyun ve Keçiler de 1-2 tablet

Buzağılar da 2-3 tablet

İnekler de 5 tablet

Kedi ve Köpekler de 10 kg' a 1/2 tablet

yemine veya suyuna karıştırılarak verilir.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER

Her tablette

VİTAMİN A	RETİNOL ASETAT 1.000.000 IU/G	5.000.000	IU/KG
VİTAMİN D3	CHOLECALCIFEROL 500.000 IU/G	500.000	IU/KG
VİTAMİN E	ALFA TOKOFEROL ASETAT % 50	5.000	MG/KG
VİTAMİN K3	MENADİON SODYUM BISÜLFİT %51	1000	MG/KG
VİTAMİN C	ASKORBİK ASİT	10.000	MG/KG
VİTAMİN B1	TIAMİN HCL %99	2.000	MG/KG
VİTAMİN B2	RİBOFLAVİN -5-FOSFAT % 80	2.500	MG/KG
VİTAMİN B3	NIASİNAMİD %99	15.000	MG/KG
VİTAMİN B5	KASİYUM -D-PANTETONAT %99	5.000	MG/KG
VİTAMİN B6	PRİDOKSİN HCL % 99	1000	MG/KG
VİTAMİN B7	D-BİOTİN %2	20	MG/KG
VİTAMİN B9	FOLİK ASİD	500	MG/KG
VİTAMİN B12	SİYANOKOBALAMİN %1	5	MG/KG
METHIONINE	DL-METHİYONİN	3.750	MG/KG
LAKTOZ	LAKTOZ MONOHİDRAT	140.000	MG/KG
MAGNEZYUM	MAGNEZYUM STEARAT	2.500	MG/KG
NIŞASTA	MİSİR NIŞASTASI	550.000	MG/KG
D.C.P	Dİ KALSİYUM FOSFAT	250.000	MG/KG
AROMA	VANİLYA AROMASI	1.000	MG/KG



MULTİ-TAB



VİTAMİN MİNERAL AMİNO ASİT PREMİKS

KULLANIM AMACI

Beslemeye bağlı vitamin, mineral ve aminoasit eksikliklerinin giderilmesin de kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Kuzu ve oğlaklar da 1 tablet
Koyun ve Keçiler de 1-2 tablet
Buzağılar da 2-3 tablet
İnekler de 5 tablet
Kedi ve Köpekler de 10 kg' a 1/2 tablet
yemine veya suyuna karıştırılarak verilir.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışıksız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR:

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.
BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER	Her 1000 gr'da
BAKIR	6.000 MG/KG
DEMİR	10.000 MG/KG
MANGAN	10.000 MG/KG
ÇİNKO	10.000 MG/KG
KOBALT	1.000 MG/KG
FOSFOR	45.000 MG/KG
KALSİYUM	60.000 MG/KG
MAGNEZYUM	2.500 MG/KG
SELENYUM	225 MG/KG
VİTAMİN A	2.500.000 IU/KG
VİTAMİN D3	250.000 IU/KG
VİTAMİN E	2.500 MG/KG
VİTAMİN K3	500 MG/KG
VİTAMİN C	5.000 MG/KG
VİTAMİN B1	1.000 MG/KG
VİTAMİN B2	1.250 MG/KG
VİTAMİN B3	7.500 MG/KG
VİTAMİN B5	2.500 MG/KG
VİTAMİN B6	500 MG/KG
VİTAMİN B7	10 MG/KG
VİTAMİN B9	250 MG/KG
VİTAMİN B12	5 MG/KG
METHIONINE	3.750 MG/KG
LİZİN	5.000 MG/KG
BETAIN	5.000 MG/KG
LAKTOZ	100.000 MG/KG
NİŞASTA	q.s.p



DIAMEZATIN



BAĞIRSAK FLORA DÜZENLEYİCİ PREMİKS

KULLANIM SAHASI/ ENDİKASYONLARI

Buzağı, dana, inek, boğa, kuzu, oğlak, koyun ve keçilerde ishal vakalarında bağırsak duvarını kaplayarak, mevcut olan bakteri ve toksinlerini absorbe ederek dışkıdan çıkmasını yavaşlatmak amacı ile kullanılır. Ayrıca hayvanalardaki vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayarak sindirim sistemi problemlerini ortadan kaldırır.

KULLANIMI ŞEKLİ

1 gr/10 kg canlı ağırlık olarak kullanılır. Günlük dozun ikiye bölünmesi tavsiye edilir.

Ticari Takdim Şekli: 20 gr cam şişe karton kutu içerisinde bulunur.

Raf Ömrü: Üretim tarihinden itibaren 2 yıldır.

BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

VİTAMİNLER			
E300	VİTAMİN C	ASCORBIK ASİT	20.000 mg/kg
E160a	VİTAMİN K3	SENTETİK MENODION	60.000 mg/kg
BAĞLAYICILAR			
	KAOLİN	KAOLİN	400.000 mg/kg
	PEKTİN	PEKTİN	60.000 mg/kg
E567	TOKSİN BAĞLAYICI	KLİNOPTOLİT	100.000 mg/kg
SİNDİRİM ARTIRICI			
	HUMİKASİT	Sodyum Hümat	400.000 mg/kg
	SODYUM	SODYUM BİKARBONAT	60.000 mg/kg
E567	MAYA EKSTRATI	SACC. CERV. EKSTRATI	100.000 mg/kg
TAŞIYICILAR			
	İNAKTİF MAYA	SACC. CERV. İNAKTİF	100.000 mg/kg



PRO-LIVESTOCK



SİNDİRİM SİSTEMİ DÜZENLEYİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Etkin mikro organizma kültür premiksdir. Koyun, kuzu, buzağı, at, kanatlı ve büyükbaş hayvanlarda; Sindirim sistemini düzenlemek. Bağışıklık sistemini güçlendirmek. Bağırsak florasını düzenlemek. Yemden yararlanmayı artırmak amacıyla kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Buzağı ve taylarda 15-30 ml

İnek ve atlarda 100-250 ml

Kuzularda 5-10 ml

2 yada 3 kez içme sularına katılarak kullanılır.

Kanatlı hayvanlarda broyler, yumuşatıcı ve damızlıklarda 1 ton günlük içme suyuna 500-1000 ml katılarak kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER

	Her Litrede
Enterococcus faecium CCM 6226	1x10 ⁸ cfu/ml
Lactobacillus plantarum DSM 11520	1x10 ⁸ cfu/ml
Bacillus subtilis MBS-BS-01	1x10 ⁸ cfu/ml
Saccharomyces cerevisiae FO 233	1x10 ⁸ cfu/ml
Bacillus amyloliquefaciens FD77	1x10 ⁸ cfu/ml
Diyonize Su	q.s.p.



PROBİOZYME



VERİM ARTTIRICI PROBİYOTİK PREMİKS

KULLANIM AMACI

Doğada hayvan vücudunda ve hayvansal ürünlerde kalıntı ya da herhangi bir kirliliğe yol açmayan ve hem kanatlı hem de büyükbaş hayvanlarda verim artırıcı özellikleri bilimsel çalışmalar ile kanıtlanmış doğal kaynaklı bir probiyotik yem katkı maddesidir.

KULLANIMI ŞEKLİ

Kanatlı hayvanlarda; 1 gr,
Koyun ve keçilerde; 3-5 gr,
Buzağılarda; 5-10 gr,
İneklere; 30-50 gr,
yemine veya suyuna katılarak 3 ila 5 gün kullanılır.
Pratik doz; 1000 litre suya 1 kg katılarak kullanılır.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILMAZ.

İÇERİKLER

	Her Litrede
Lactobacillus plantarum	1x10 ⁸ cfu/gr
Lactobacillus acidophilus	1x10 ⁸ cfu/gr
Lactobacillus salivarius	1x10 ⁸ cfu/gr
Bacillus subtilis	1x10 ⁸ cfu/gr
Humik-fulvik asit	%25
Demir	%0,25
Çinko	%0,1
Kalsiyum	%10
Magnezyum	%1,5
Selenyum	%0,07
İnaktif Maya	q.s.p.



CRYPTOX



SİNDİRİM SİSTEMİ DÜZENLEYİCİ PREMİKS

KULLANIM AMACI

Hayvanlarda bağırsak florasını düzenlemek amacı ile kullanılır.

KULLANIMI ŞEKLİ

Buzağılarda : 30 ila 50 gr
Koyun ve Keçilerde : 5 ila 10 gr
İneklerde : 100 gr
Yem veya suya karıştırılarak verilir.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER	Her 1000 gr'da
BETA GLUCAN	60.000 MG/KG
İNÜLİN	20.000 MG/KG
LESİTİN	25.000 MG/KG
AKTİF KARBON	25.000 MG/KG
ENTEROCOCCUS FACEIUM	1x10 ⁹ CFU/GR
BACILLUS SUBTILIS	1x10 ⁹ CFU/GR
BACILLUS LICHENIFORMIS	1x10 ⁹ CFU/GR
LACTOBACILLUS PLANTARUM	1x10 ⁹ CFU/GR
HÜMİK ASİT	50.000 MG/KG
VİTAMİN K3	1.000 MG/KG
PECTİN	50.000 MG/KG
MANNAN OLİGO SAKKARİT	q.s.p.



MENTO-BRONCHE



SOLUNUM YOLU RAHATLATICI PREMİKS

KULLANIM AMACI

İnek, at, koyun, kuzu, kedi ve köpeklerde:

Solunum yolu enfeksiyonlarına karşı direnci artırır. Ekspektoren etki sağlayarak burun boşluğundan mukus atılımını artırarak hızlandırır. Nefesin açılmasına yardımcı olur. Bronşcularda mukus üretimini ve salınımını önler. Sinüslere rahatlatıcı etki yapar. Bunaltıcı sıcak hava şartlarında nefes almakta zorlanan hayvanlarda nefes açıcı özelliği ile rahatlatma sağlar. Antifungal ve Antiviral etkisi ile Sekonder hastalıkların oluşumunu engellemeye yardımcı olur. Kilo kaybı ve iştahsızlığın giderilmesinde ve hastalıklara karşı direnç artırımında etkilidir.

KULLANIMI ŞEKLİ

İneklere; 10-15 ml 5 pompa,

Keçi, buzağı ve koyunlarda; 3-5 ml 2 pompa

Kuzu oğla kedi ve köpeklerde; 0,5-1 ml - 1 pompa olarak

Solunum sistemini desteklemek amacıyla inek, buzağı, kuzu, koyun, kümes hayvanları kedi ve köpeklerin içme sularının tonuna 0,5 kg-1 kg katılarak kullanılabilir.

DEPOLAMA ŞEKLİ

Oda sıcaklığında serin, kuru ve ışsız ortamda depolanmalıdır.

UYARILAR

Çocukların ulaşamayacağı yerlerde muhafaza ediniz. Hedef hayvanlar dışında kullanmayınız.

BU BİR İLAÇ DEĞİL YEM PREMİKSİDİR. TEDAVİ AMAÇLI KULLANILAMAZ.

İÇERİKLER	Her Litrede
OKALİPTÜS	20.000 MG/L
NANE	20.000 MG/L
KEKİK	5.000 MG/L
MENTHOL	30.000 MG/L
PEG 40	120.000 MG/L
DIYONİZE SU	q.s.p.





PROVİTA PHARMA
İLAÇ KİMYA İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.

**PROVİTA PHARMA İLAÇ KİMYA
İTH. İHR. TİC. LTD. ŞTİ.**

Menderes Mahallesi Alparslan Caddesi
No: 30/C Sincan / ANKARA



0850 304 43 21

0541 7 7 6 8 4 8 2

info@provitapharma.com.tr
www.provitapharma.com.tr